LAS SANGUIJUELAS
de Louis Léopold Boilly (1827).
(Véase a la vuelta.)

Calcio-diuretina «Knoll»
(Salicilato de calcio y de teobromina).
Serie I, n.o 3.

LAS SANGUIJUELAS

de LOUIS LÉOPOLD BOILLY (1827).

La manera francesa de agrupar pequeñas escenas en un espacio reducido creó también una serie de estampas que revisten interés médico. Tales son las escenas tomadas del estado grávido, las del tratamiento por el magnetismo con muchas otras más. La presente lámina nos trae a la memoria que hacia el año 1827 les tocó el turno de volverse precisamente de moda a las sanguijuelas a título de herederas atenuadas de la gran sangría, llegándose hasta a aplicarlas dentro de la boca.

Calcio-diuretina «Knoll»

(Salicilato de calcio y de teobromina).

Preparación nueva de teobromina, perfectamente tolerable y libre de todo sabor a lejía.

La acción de este preparado se basa en los tres siguientes factores, todos ellos de gran valor terapéutico: **teobromina, cal y ácido salicílico.**

No sabe a lejía, porque la componente cálcica substituye en la diuretina la soda.

Tolerancia indiscutible, debida a que el preparado atraviesa el estómago sin llegar casi a disolverse, no iniciándose sino en el intestino su disolución y respectiva resorción.

En virtud de la componente cálcica químicamente fijada en el preparado, tiene lugar en la eficacia del salicilato de teobromina un valiosísimo aumento científicamente basado.

Exigiendo el empaque de origen, se tiene la garantía de no emplear ninguna de las imitaciones o «sucedáneos» de escaso valor.

Pídanse y empléense preferentemente las tabletas de calcio-diuretina.

Indicaciones: muy especialmente para curas crónicas en casos de arteriosclerosis, estados espasmódicos de los vasos, asma, angina de pecho y asímismo como diurético. — *Dosado:* en la arteriosclerosis 2 a 3 tabletas diarias, en la angina de pecho 4 a 6 tabletas (y para obtener efectos diuréticos hasta 5 g. diarios). Para curas crónicas 1 a 2 tabletas unas 3 veces al día. — *Empaques: polvos* en botes de 25 g. y *tabletas* de 50 cg en tubos de 20 tabl.

EST 303.005